

Otsuka **Jinarc® ▼ (tolvaptán)** Figyelmeztető kártya betegeknek

A beteg neve:

A Jinarc® első felírásának dátuma:

Az orvos neve:

A kórház neve és telefonszáma:

Verziószám: 1.0; OGYÉI jóváhagyás dátuma: ÉÉÉÉ. HH. NN.

Azonosító: OPEL/1018/JIN/1583d; Lezárás dátuma: ÉÉÉÉ. HH. NN.

Fontos gyógyszerbiztonsági tájékoztatás betegeknek

A Jinarc® **befolyásolhatja a májműködését.**

Forduljon kezelőorvosához, ha fáradtság, étvágytalanság, a has felső részén jelentkező fájdalom vagy kellemetlen érzés, láz, sötét vizelet vagy a bőr, illetve a szemek besárgulása, lázzal járó ízületi és izomfájdalom (influenzaszerű tünetegyüttes), viszketés, hányinger és hányás fordul elő Önnél.

A Jinarc® **súlyos kiszáradást okozhat.**

A kiszáradás vagy túlzott vízvesztés elkerülése érdekében fogyasszon sok folyadékot, és forduljon kezelőorvosához, ha nem tud szájon át inni.

Verziószám: 1.0; OGYÉI jóváhagyás dátuma: ÉÉÉÉ. HH. NN.

Azonosító: OPEL/1018/JIN/1583d; Lezárás dátuma: ÉÉÉÉ. HH. NN.

Fontos gyógyszerbiztonsági tájékoztatás a mentőszolgálat munkatársai számára

A Jinarc® májkárosodást okozhat. Rendszeres májfunkciós vérvizsgálatokat kell végezni (az első 18 hónapban havonta, azt követően 3 havonta).

A Jinarc® gátolja a vazopresszin hatását a vesében és ennek következtében fokozza a vizeletürítést, ami súlyos kiszáradáshoz vagy fokozott vízvesztéhez vezethet. A kiszáradás tünetei a következők lehetnek: fokozott szomjúság érzet, szájszárazság, fáradtság vagy álmoság, a vizeletürítés csökkenése, fejfájás, száraz bőr, szédülés, szapora szívverés, zavartság és a bőr rugalmasságának csökkenése.

Verziószám: 1.0; OGYÉI jóváhagyás dátuma: ÉÉÉÉ. HH. NN.

Azonosító: OPEL/1018/JIN/1583d; Lezárás dátuma: ÉÉÉÉ. HH. NN.